

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse	
Adapaleen + bensüülperoksiid	Akne ravi	kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, naha värvuse muutus, urtikaaria, manustamiskoha põletus (teatatud on teise astme põletusest või rasketest põletuse reaktsioonidest)	riiklik muutus
Asatsitidiin	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: perikardiit	PRAC soovitus
Dilämmastikoksiid, dilämmastikoksiid + hapnik	Anesteesia ja valu ravi	kõrvaltoime: generaliseerunud krampihood	PRAC soovitus
Ebastiin	Allergilise riniidi, urtikaaria ravi	kõrvaltoimed: söögiisu suurenenemine, kehakaalu tõus	PRAC soovitus
Fentanüül (süstitav)	Valu ravi	kõrvaltoimed: deliirium, ravimi ärajätusündroom	PRAC soovitus
Fentanüül (transdermaalne plaaster)	Valu ravi	kõrvaltoimed: androgeenide defitsiit, deliirium	PRAC soovitus
Imatiniib, dasatiniib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: trombootiline mikroangiopaatia	PRAC soovitus
Kapetsitabiin	Kasvajavastane ravi	vastunäidustus ja hoiatus: hiljutine või samaaegne ravi brivudiiniga suurendab kapetsitabiini toksilisust, mis võib lõppeda surmaga	PRAC soovitus
Leetrite, mumpsi ja punetiste (elus)vaktsiin	Vaktsineerimine	kõrvaltoime: nut	PRAC soovitus
Loperamiid, loperamiid + simetikoon	Ägeda kõhulahtisuse ravi	hoiatus: üleannustamisega seoses on teatatud kardiaalsetest tüsistustest, sealhulgas QRS-kompleksi laienemisest	PRAC soovitus
Metüülfenidaat	Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravi	hoiatus: serotonergiliste ravimite samaaegse manustamise järgselt on teatatud serotoniinisündroomist	riiklik muutus
Milnatsipraan	Depressiooni ravi	kõrvaltoime: Takotsubo kardiomiopaatia (stressi põhjustatud kardiomiopaatia)	PRAC soovitus
Mirabegroon	Üliaktiivse põie sündroomi ravi	kõrvaltoime: segasusseisund	PRAC soovitus

2019-02 - PRAC soovitused ja teised ohutusalsed muutused

Misoprostool	Sünnituse esilekutsumine	kõrvaltoime: misoprostooli kasutamisel sünnituse esilekutsumiseks lühikese perioodi jooksul raseduse lõpus puudub risk loote väärarengute tekkeks. Misoprostooli ei tohi kasutada mistahes muul ajal raseduse jooksul, sest väärarengute risk suureneb kolmekordselt (sh Moebius'e sündroom, amnioni väädi sündroom ja kesknärvisüsteemi anomaaliad)	PRAC soovitus
Nabumetoon	Valu ja reumaatiliste haiguste ravi	kõrvaltoimed: aneemia, aseptiline meningiit (eeskätt süsteemse erütematoosse luupuse või segatüüpi sidekoe haigusega patsientidel)	riiklik muutus
Nivolumab	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: aseptiline meningiit, sarkoidoos	PRAC soovitus
Pertuzumab	Kasvajavastane ravi	hoiatus: infusioonireaktsioonid ja ülitundlikkusreaktsioonid/anafülaksia võivad lõppeda surmaga	PRAC soovitus
Rotaviiruse elusvaktsiin	Vaktsineerimine	kõrvaltoime: urtikaaria täiendatakse hoiatust: teadaoleva või arvatava immuunpuudulikkusega vastsündinute (kaasa arvatud in utero kokkupuude immunosuppressioonraviga), vaktsineerimine peaks tuginema võimaliku kasu ja riskide hoolikale kaalumisele	PRAC soovitus
Tseftriaksoon	Infektsioonide ravi	kõrvaltoimed: eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (DRESS); Jarisch-Herxheimeri reaktsioon	PRAC soovitus
Tsefuroksiim (intrakameraalne)	Kaeoperatsiooni järgse endoftalmiidi profülaktika	hoiatus: ravimi lahustamiseks tohib kasutada ainult 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahust kõrvaltoime: maakula turse	PRAC soovitus