

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimteabesse lisatakse
Febuksostaat	Kroonilise hüperurikeemia ravi	kõrvaltoime: agranulotsütoos
Gentamütsiin	Infektsioonide ravi	kõrvaltoimed: äge neerupuudulikkus, Fanconi-laadne sündroom suurte annustega pikaajalist ravi saavatel patsientidel, pöördumatu kuulmisnõrkus, kurtus.
Glükoosamiin	Osteoartroosi ravi	koostoime: suukaudsete K-vitamiini antagonistidega kooskasutamisel on teatatud INR väärtuse tõusust
Ibrutiniib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: pannikuliit
Insuliin (eeltäidetud pensüstlites ja kolbampullides):	Suhkurtõve ravi	Tavatugevusega (100 ühikut/ml) ja väiksema tugevusega (< 100 ühikut/ml) insuliinide manustamisega seotud teavet muudeti järgmiselt: kolbampullides ja eeltäidetud pensüstlites olev insuliin on ette nähtud üksnes subkutaanseks süstimiseks. Kui ravimit on vaja manustada süstlaga, intravenoosse süstega või infusioonipumbaga, tuleb insuliin võtta viaalist.
Ivermektiin	Rosacea ravi	kõrvaltoime: näoturse
Klaritromütsiin	Infektsioonide ravi	hoiatus: uutes ülevaateuuringutes tuvastati klaritromütsiiniga sagedasemat lühiajalise arütmia, müokardiinfarkti ja makroliididega seotud kardiovaskulaarsetest haigustest tingitud surmajuhtude esinemist
Lantaan	Hüperfosfateemia ravi	hoiatus: lantaan võib ladestuda seedetrakti limaskestast (enamasti pärast pikaajalist kasutamist), sümptomiteks kõhukinnisus ja kõhuvalu/distensioon, mis võivad viidata soolesulgusele, iileusele või subiileusele. hoiatus: närimata või halvasti näritud närimistablettide neelamise tõttu on esinenud tõsiseid seedetrakti tüsistusi.
Metüleentioniinkloriid (metüleensinine)	Methemoglobulineemia ravi	hoiatus: serotoninergilise sündroomi risk kasutamisel koos serotonergiliste ravimitega (SSTid, SNTid ja MAO inhibiitorid). hoiatus ja kõrvaltoime: naha valgustundlikkusreaktsioon tugevate valgusallikate mõjul (sh fototeraapia, operatsioonisaali valgustus või paigsed valgustusseadmed nagu pulssoksümeetrid).

Mükofenoolhape	Siiriku äratõukereaktsiooni ravi	<p>teave: mükofenolaadi kasutamise ajal tuleb rasedusest hoiduda. Rasestumisvõimelised naised peavad kasutama vähemalt ühte usaldusväärset rasestumisvastast meetodit enne ravi alustamist, ravi ajal ja kuus nädalat pärast ravi lõpetamist, kuid eelistatav on kahe täiendava rasestumisvastase meetodi samaaegne kasutamine. Enne ravi alustamist peab raseduse puudumine olema kinnitatud kaks korda negatiivse tulemusega seerumist või uriinist tehtud rasedustestil.</p> <p>Seksuaalselt aktiivsetel meespatsientidel või nende naissoost partneritel on soovitatav kasutada usaldusväärset kontratseptsiooni kogu meespatsiendi ravi vältel ja vähemalt 90 päeva pärast ravi lõpetamist.</p> <p>koostoimed:</p> <p>kolestüramiin võib vähendada mükofenoolhappe efektiivsust</p> <p>aminoglükosiidid, tsefalosporiinid, fluorokinoloonid ja penitsilliinide klassi antibiootikumid võivad põhjustada süsteemset mükofenoolhappe ekspositsiooni vähenemist.</p> <p>isavukonasool ja telmisartaan võivad suurendada mükofenoolhappe ekspositsiooni.</p>
Simepreviir	C-hepatiidi ravi	hoiatus: haiglaravi vajavad valgustundlikkusreaktsioonid, mistõttu tuleb kasutada päikesekaitsevahendeid.
Simvastatiin	Hüperkolesteroleemia ravi	kõrvaltoime: anafülaksia
Somatotropiin	Kasvuhormoon	<p>hoiatus: naised võivad vajada suuremaid somatotropiini annuseid kui mehed, kuna meestel võib tundlikkus IGF-I suhtes aja jooksul suurened.</p> <p>koostoime: suukaudse östrogeeniga koosvõtmisel võib olla vajalik suurendada somatotropiini annust, et säilitada seerumi IGF-1 tase tavapärase vanusele vastavas vahemikus. Kui naine lõpetab suukaudse östrogeeni võtmise, võib olla vajalik vähendada somatotropiini annust, et vältida liigset kasvuhormooni taset ja/või kõrvaltoimeid</p>
Tofatsitiniib	Reumatoidartriidi ravi	kõrvaltoime: ülitundlikkus, angioödeem, urtikaaria.
Tsefuroksiimnaatrium (parenteraalne)	Infektsioonide ravi	hoiatus: IV/IM manustamiseks näidustatud tsefuroksiimnaatrium ei ole ette nähtud intrakameraalseks kasutamiseks, sest silma manustamisel on teatatud tõsistest silma kõrvaltoimetest (maakula turse, võrkkesta turse, võrkkesta irdumine, võrkkesta kahjustus, nägemishäired, nägemisteravuse langus, ähmane nägemine, sarvkesta hägusus ja sarvkesta turse).
Vedolizumab	Haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravi	kõrvaltoimed: kopsupõletik, ähmane nägemine