

2019-05 - PRAC soovitused ja teised ohutusalsed muutused

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse	
Amisulpriid	Skisofreenia ravi	hoiatus: maksatoksilisuse risk. Patsienti peab juhendama, et ta teataks maksakahjustuse sümptomitest (asteenia, anoreksia, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu või ikterus)	riiklik muutus
Deksametasoon	Hulgimüeloomi ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: tuumori lüüsi sündroom: TLSi kõrge riskiga patsiente (nt kõrge proliferatsiooni kiirus, suur tuumor ja kõrge tundlikkus tsütotoksiliste ainete suhtes) tuleb hoolikalt jälgida ja vajadusel rakendada ettevaatusabinõusid	PRAC soovitus
Denosumab	Osteoporoosi ja luukao ravi	kõrvaltoimed: alopeetsia, lihhenoidne ravimlööve, hüpokaltseemia sh surmaga lõppenud juhud	PRAC soovitus
Everoliimus	Äratõukereaktsiooni ravi	kõrvaltoime: lümfödeem	PRAC soovitus
Klopidogreel	Tromboosi profülaktika	koostoime: klopidogreeli ekspositsioon ja trombotsüütide inhibeerimise keskmine määr võivad ritonaviiri samaaegsel kasutamisel väheneda	PRAC soovitus
Naloksegool	Opioid-indutseeritud kõhukinnisuse ravi	kõrvaltoime: seedetrakti perforatsioon	PRAC soovitus
Naltreksoon + bupropioon	Kehakaalu langetamine	kõrvaltoime ja hoiatus: unisus, teadvuse kaotus (mõnikord põhjustatud krambihoo tõttu). Patsientidel tuleb soovitada kuni nende kõrvaltoimete kadumiseni autojuhtimist või masinate käsitsemist vältida	PRAC soovitus
Niraparaiib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: febriilne neutropeenia	PRAC soovitus
Pantoprasool	Refluksösofagiidi jt ravi	kõrvaltoime: mikroskoopiline koliit	PRAC soovitus
Sertraliin	Depressiooni ravi	kõrvaltoime: makulopaatia	PRAC soovitus
SSRI ja SNRI	Depressiooni ravi	hoiatus ja kõrvaltoime: selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid ja serotoniini-noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid võivad põhjustada seksuaalfunktsiooni häireid, sh pikaajalisi häireid, mis püsivad vaatamata ravi lõpetamisele	PRAC soovitus
Trientiin	Wilsoni tõve ravi	hoiatus: suure annuse (40 g) üleannustamisel võivad tekkida pearinglus ja oksendamine	PRAC soovitus
Vortioksetiin	Depressiooni ravi	kõrvaltoimed: anafülaktiline reaktsioon, hemorraagia (sh kontusioon, verevalum, ninaverejooks, seedetrakti või vaginaalne verejooks), lööve	PRAC soovitus