

## 2019-01 - PRAC soovitused ja teised ohutusalsed muutused

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse	
Abirateroon	Kasvajavastane ravi	hoiatus: <b>rabdomüolüüsi tekkerisk esimese 6 ravikuu jooksul</b>	PRAC soovitus
Atesolizumab	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: <b>nefriit</b>	PRAC soovitus
Biotiin	Vitamiini vaeguse ennetamine	hoiatus: <b>mõju laborianalüüside tulemustele: biotiin võib mõjuta biotiini/streptavidiini koostoimel põhinevate laborianalüüside tulemusi. Võimaliku mõjuga tuleb arvestada juhul, kui tulemused ei vasta kliinilisele pildile (nt Gravesi tõvele iseloomulikud kilpnäärme laboriuuringu tulemused asümptomaatilistel patsientidel või valenegatiivsed tulemused troponiini määramisel müokardiinfarktiga patsientidel)</b>	PRAC soovitus
Bortesomiib	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: <b>silmas rahetera, blefariit, trombootiline mikroangiopaatia</b>	PRAC soovitus
Deoksükoolhape	Lõuatsialuse rasvaladestuse ravi	hoiatus: <b>nahahaavandite ja nekroosi teke ebaõigete süstimisvõtete tõttu</b> kõrvaltoimed: <b>nekroos süstekohal, arteri nekroos süstekohal</b>	PRAC soovitus
Detsitabiin	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: <b>kardiomüopaatia</b>	PRAC soovitus
Dienogest + etinüülöstradiol	Raseduse vältimine	hoiatus: <b>hinnanguliselt tekib 10 000-st naisest ligikaudu 8...11 naisel ühe aasta jooksul venoosne trombemboolia</b>	riiklik muutus
Efavirens	HIV ravi	koostoime: <b>etonogestreeli ekspositsioon võib väheneda (kontratseptsiooni ebaõnnestumise risk)</b>	PRAC soovitus
Epoprostenool	Primaarse pulmonaalse hüpertensiooni ravi, hemodialüüs	kõrvaltoime: <b>suure väljutusmahuga südamepuudulikkus</b>	riiklik muutus
Gabapentiin	Epilepsia ravi	kõrvaltoime: <b>düsfaagia</b>	PRAC soovitus
Hüdroklorotiasiid	Tursete, hüpertensiooni ravi	hoiatus: <b>süsteemse erütematoosse luupuse ägenemine või aktiveerumine</b>	riiklik muutus
Isotretinoiin	Akne ravi	kõrvaltoime: <b>günekomastia</b>	PRAC soovitus

## 2019-01 - PRAC soovitused ja teised ohutusalsed muutused

<b>Ivermektiin</b>	Rosacea ravi	kõrvaltoime: <b>transaminaaside aktiivsuse suurenemine</b>	PRAC soovitus
<b>Lamotrigiin</b>	Epilepsia, bipolaarse häire ravi	kõrvaltoimed: <b>hemofagotsütaarne lümfohistiotsütoos, Brugada tüüpi EKG, hüpogammaglobulineemia</b>	riiklik muutus
<b>Norfloksatsiin</b>	Infektsioonide ravi	kõrvaltoimed: <b>valgustundlikkus, perifeerne neuropaatia, kolestaatiline hepatiit</b> hoiatus: <b>müasteenia sümptomid võivad süveneda</b>	riiklik muutus
<b>Nortriptüliin</b>	Depressiooni ravi	koostoime: <b>valproehape võib tõsta nortriptülliini plasma kontsentratsiooni</b>	PRAC soovitus
<b>Oksaliplatiin</b>	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: <b>äge müokardiisheemia, k.a müokardiinfarkt, pärgarterite spastiline ahenemine ja stenokardia, ösofagiit</b>	PRAC soovitus
<b>Oksükodoon</b>	Valu ravi	koostoimed: <b>SSRI või SNRI koosmanustamisel serotoniini toksilisuse risk</b>	PRAC soovitus
<b>Sunitiniib</b>	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: <b>aordianeürüsm ja –disseksioon, koliit, isheemiline koliit</b>	PRAC soovitus
<b>Takroliimus</b>	Äratõukereaktsiooni ravi	kõrvaltoimed: <b>nägemisnärvi neuropaatia, trombootiline mikroangiopaatia</b> koostoime: <b>isavukonasool, kobitsistaat, nilotiniib, imatiniib, ritonaviir (takroliimuse kontsentratsioon suureneb), mükofenoolhape (tsüklosporiinilt takroliimusele üleminekul võib mükofenoolhappe plasmataase ja efektiivsus väheneda)</b>	PRAC soovitus
<b>Valproehape</b>	Epilepsia, bipolaarse häire ravi	kõrvaltoime: <b>diploopia</b>	riiklik muutus
<b>Vedolizumab</b>	Haavandilise koliidi, Crohni tõve ravi	kõrvaltoime: <b>Herpes zoster</b>	PRAC soovitus