

Toimeaine	Kasutusvaldkond	Ravimiteabesse lisatakse
Atesolizumab	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoime: uveiit, psoriaas
Belimumab	Autoimmuunhaiguste vastane ravi	hoiatus: enne ravi alustamist Benlystaga tuleb kaaluda pneumokokivastast vaktsineerimist.
Brodalumab	Psoriaasi ravi	kõrvaltoime ja hoiatus: põletikuline soolehaigus (sh Crohni tõbi ja haavandiline koliit), seetõttu ei ole põletikulise soolehaigusega patsientidel soovitatav brodalumabi kasutada. Kui tekivad põletikulise soolehaiguse sümptomid või olemasolev põletikuline soolehaigus ägeneb, tuleb brodalumabi kasutamine lõpetada ja alustada sobivat ravi
Duloksetiin	Depressiooni ravi	kõrvaltoime: raseduse teises pooles kasutamisel võib suureneda enneaegse sünnituse oht (6 enneaegselt sündinud lapse lisandumine iga 100 naise kohta, kes võtavad duloksetiini raseduse teises pooles), enamasti 35. kuni 36. rasedusnädalal
Erenumab	Migreeni profülaktika	hoiatus: kõhukinnisus võib tekkida pärast esimest annus või hiljem, üldiselt laheneb kolme kuuga. Teatatud on raskete tüsistustega (sh operatsioon) kõhukinnisusest. Varem esinenud kõhukinnisus või seedetrakti motiilsuse vähenemist põhjustavate ravimite samaaegne kasutamine võib suurendada raskema kõhukinnisuse ja võimalike kõhukinnisuse tüsistuste riski
Fenütoiin	Epilepsia ravi	hoiatused: raseduse ajal fenütoiini saanud emade lastel on teatatud pahaloomuliste kasvajate (sh neuroblastoomi) juhtudest. Epilepsia ravimite ja teiste tegurite roll ei ole siiski kindlaks tehtud kõrvaltoimed: hüperglükeemia (toksilise plasmataseme korral), puhas punalibleaplaasia/aplastiline aneemia, sekundaarne hüperparatüreos
Flutsikloviin (18F)	Diagnostikum (PET) uuringul - eesnäärmevähi avastamiseks	hoiatus: aine varane põide eritumine võib maskeerida või imiteerida eesnäärmevähi paikset taasteket, seetõttu võib patsient põit tühjendada hiljemalt 60 minutit enne flutsikloviini (18F) süsti ning hoiduma põie tühjendamisest, kuni uuring on lõppenud
Hüdroksüklorokviin	Reumatoidartriidi, malaaria ravi	koostoimed: kitsa terapeutilise vahemikuga ravimite (nt digoksiin, tsüklosporiin, dabigatraan, flekainiid, propafenoon jt) tase võib tõusta – jälgida kõrvaltoimete suhtes/plasmakontsentratsiooni; rifampitsiini, karbamasepiini, fenobarbitaali, fenütoiini naistepunaürdi toimel võib hüdroksüklorokviini toime oluliselt väheneda; tsimetidiini toimel võib hüdroksüklorokviini toime tugevneda; sama risk on koos gemfibrosiili, klopidogreeli, ritonaviiri, itrakonooli, klaritromütsiini, greibimahlagaga; antatsiide tuleb manustada vähemalt kaks tundi enne hüdroksüklorokviini

2020-08 ohutusalsed muutused

Ibrutiniib	Kasvajavastane ravi	hoiatused ja kõrvaltoimed: põrna rebend (teatatud ravi katkestamise järgselt) - ravi lõpetamisel tuleb hinnata haiguse staatust ja põrna suurust (sh UH). Valu tekkel vasakul ülakõhus või õlavöötme ülemises osas tuleb kaaluda põrna rebendi diagnoosi Südamepuudulikkus võib tekkida ravi ajal ja vajada ravimi ärajätmist või annuse vähendamist Hemofagotsüütiline lümfohistiotsütoos (HLH) (sh surmlõppega) - patsiente tuleb teavitada HLH nähtudest. Patoloogilise immuunsuse aktiveerumise ilmnemisel tuleb patsienti hinnata ja kaaluda HLH diagnoosi
Iksasomiib	Hulgimüeloomi ravi	hoiatus: trombootiline mikroangiopaatia, sh trombootilise trombotsütopeenilise purpuri (TTP) tekke risk (sh surmlõppega juhud)
Lenograsiim	Febriilse neutropeenia ravi	kõrvaltoime: C-reaktiivse valguga tõus; venoosne trombemboolia, arteriaalne trombemboolia; teadaolevate tromboosi riskifaktoritega doonoreid ja patsiente on soovitatav hoolikalt jälgida
Metoprolol	Hüpertensiooni, stenokardia ravi	koostoimed: hingolimidiga suurem bradükardia risk; aldesleukiiniga vererõhu tugeva languse risk
Piperakviin / artemiimool	Malaaria ravi	hoiatus: Kagu-Aasias esineb ravimresistentsust – malaaria taastekke või selle kahtluse korral tuleb ravida muu malaariaravimiga koostoime: efavirensi toime väheneb piperakviini plasmasisaldus 43% - ravi ebaõnnestumise risk
Pseudoefedriin (süsteemne)	Nohu ravi	kõrvaltoime: ajuinsuldust ja müokardiinfarktist on teatatud turustamise ajal, kuid müügiloa saamise järgses ohutusuringus ei ilmnunud mingeid tõendeid nende suurenenud riski kohta
Rotaviiruse vaktsiin (RotaTeq)	Immuniseerimine	hoiatus: üsasiseselt immunosupressiivse raviga kokku puutunud lastele elusvaktsiini manustamine peab põhinema võimaliku kasu ja riski hoolikal kaalumisel
Ruksolitiiniib	Müelofibroosi ravi	kõrvaltoimed: verejooksud (sh ninaverejooks, protseduurijärgne hemorraagia ja hematuuria), hüpertriglütserideemia, vere lipaasisalduse suurenemine
Tenofoviiralafenamiid	B-hepatiidi ravi	hoiatus: neerufunktsiooni tuleb hinnata enne ravi alustamist ja ravi ajal; kui neerufunktsioon oluliselt väheneb või ilmnevad proksimaalse renaalse tubulopaatia sümptomid, tuleb kaaluda ravi katkestamist
Tsemitlimab	Kasvajavastane ravi	kõrvaltoimed: siiriku äratõukereaktsioon, reumaatiline polümüalgia, müosiit